



FIOCRUZ

# Concurso Público Fiocruz 2023

## Tecnologista em Saúde Pública

### Prova Discursiva

TE65

## Enfermagem - Terapia intensiva neonatal e pediátrica

### Espelho de Resposta

**Pontuação da Questão Discursiva conforme Anexo II do Edital nº 2, de acordo com a Unidade detentora da vaga.**

Espera-se que o candidato, no desenvolvimento do tema, tenha feito considerações técnicas adequadas sobre os seguintes pontos:

1. O candidato deve fornecer uma resposta precisa e concisa à questão, identificando corretamente a asfixia perinatal como a principal causa de parada cardiorrespiratória (PCR) em neonatos na sala de parto.
2. O candidato deve identificar corretamente os principais sinais clínicos que indicam a necessidade de iniciar a reanimação neonatal em recém-nascidos na sala de parto. Isso inclui a ausência de respiração ou choro, a falta de movimentos respiratórios regulares, e um tônus muscular inadequado, indicando não apresentar boa vitalidade.
3. O candidato deve abordar de forma abrangente e detalhada as etapas iniciais da reanimação neonatal, demonstrando compreensão dos procedimentos essenciais e dos parâmetros a serem monitorados durante o processo. Isso inclui a descrição precisa das ações a serem tomadas para garantir a manutenção da normotermia e das vias aéreas périvas, bem como a avaliação rápida e precisa da frequência cardíaca (FC) e da respiração do recém-nascido (RN). O candidato deve ter explicado como posicionar o RN, verificar e assegurar a permeabilidade das vias aéreas, e iniciar a ventilação com pressão positiva (VPP), quando indicado. Deve ter fornecido orientações claras sobre a técnica adequada de ventilação, incluindo o uso correto da máscara facial, ajuste da pressão inspiratória e frequência de ventilação.  
Além disso, espera-se que o candidato tenha discutido os critérios para decidir continuar, modificar ou interromper as manobras de reanimação, destacando a importância da melhora ou estabilização da FC, retorno da respiração espontânea e melhora do tônus muscular como indicadores de eficácia das intervenções. A abordagem de situações específicas, como a necessidade de massagem cardíaca, fornecendo orientações claras sobre a técnica adequada e frequência. O momento de iniciar abordagem medicamentosa em casos de falha de resposta inicial, também deve ter sido pontuada.  
Em resumo, espera-se que o candidato tenha apresentado uma resposta completa, precisa e fundamentada nas diretrizes clínicas atualizadas, demonstrando profundo conhecimento sobre as práticas de reanimação neonatal e a capacidade de aplicar esses conhecimentos em situações práticas.
4. O candidato deve abordar de forma precisa e abrangente o momento adequado para iniciar a administração de medicamentos durante a reanimação neonatal, identificando a adrenalina como fármaco preferencial para tratar a bradicardia neonatal, e sendo indicada quando a FC

permanece persistentemente abaixo de 60 bpm, apesar das medidas de reanimação inicial, como ventilação efetiva e massagem cardíaca adequada.

Além disso, espera-se que o candidato tenha fornecido informações de que a via preferencial é a endovenosa, geralmente realizada através da veia umbilical.